



Noremifa[®]
SCIROPPO
ANTIREFLUSSO

Indicazioni

Dispositivo medico destinato ad esercitare un'azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo e/o faringolaringeo, al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: rigurgito acido, pirosi (bruciore di stomaco), sensazione di globo ipofaringeo, infiammazione faringolaringea, eruttazione, senso di tensione addominale, tosse, disfonia (alterazione della voce), e in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastroesofageo e/o faringolaringeo. Coadiuvante i processi di riepitelizzazione della mucosa gastroesofagea e faringolaringea. Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco.
Uso orale.

Composizione

Magnesio alginato, Simeticone, Fruttosio, Gomma Xanthan, Miele, D-pantenolo, Estratti fluidi di Althaea Officinalis e Papaver Rhoeas, Zinco Ossido, Sodio Bicarbonato, Sodio Idrossido, p-Ossibenzoato di Metile Sodico, p-Ossibenzoato di Propile Sodico, Aromi naturali, Eritrosina (E127), Acqua Depurata.

Senza glutine, senza lattosio

Confezioni

Flaconi da 200 ml e da 500 ml con cucchiaino dosatore.
Astuccio da 25 bustine da 20 ml.

Modalità d'uso Flacone

Agitare energicamente prima dell'uso.

Adulti e bambini sopra i 12 anni: 20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Modalità d'uso Bustina monodose

Adulti e bambini sopra i 12 anni: 1 bustina da 20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Avvertenze


- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
- Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso.
- In caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
- È consigliabile interporre un intervallo di almeno un'ora tra l'assunzione del prodotto e quella di farmaci.
- Per l'assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso, senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.
- Per la confezione in flacone si raccomanda di richiudere bene il flacone dopo l'uso.

La presenza di sostanze naturali può incidere sulle caratteristiche organolettiche del prodotto; si possono pertanto rilevare variazioni di colore e/o sapore senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.

Rev. 09/2019

Dompé farmaceutici S.p.A.
Via San Martino, 12
20122 Milano

 DMG Italia Srl
Via Laurentina, Km 26,700 - 00071 - Pomezia (Roma)



CE
0373

30FG400



Dompé

Noremifa[®]
SCIROPPO PEDIATRICO 0-12
ANTIREFLUSSO

Indicazioni

Dispositivo medico destinato ad esercitare un'azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo e faringolaringeo nei neonati e nei bambini, al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: rigurgiti, tosse, pirosi (bruciore di stomaco), infiammazione rinofaringea, disfonia (alterazione della voce) e in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastroesofageo e faringolaringeo.

Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco.

Uso orale.

Composizione

Magnesio alginato, Simecicone, Fruttosio, Gomma Xanthan, D-pantenolo, Sodio bicarbonato, Sodio idrossido, p-Ossibenzoato di Metile, p-Ossibenzoato di Propile, Aromi naturali, Acqua depurata.

Senza glutine, senza lattosio

Confezione

Flacone da 200 ml. Contiene cucchiaino dosatore.

Modalità d'uso

Agitare energicamente prima dell'uso.

Neonati fino a 5 kg di peso: 2,5-3 ml, 5-10 minuti dopo la poppata o secondo diverso consiglio medico. In caso di rigurgito dopo la somministrazione, somministrare 1 ml aggiuntivo.

Bambini fino a 3 anni di età: 5 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Bambini fino a 12 anni: 10-20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Avvertenze

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
- Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso.
- In caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
- È consigliabile interporre un intervallo di almeno un'ora tra l'assunzione del prodotto e quella di farmaci.
- Per eventuale assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso e/o con modeste variazioni di colore, senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.
- Si raccomanda di richiudere bene il flacone dopo l'uso.

Rev. 09/2019


Dompé farmaceutici S.p.A.

Via San Martino, 12
20122 Milano



DMG Italia Srl

Via Laurentina, Km 26,700
00071 Pomezia (Roma)



CE
0373

30FG403